



ほくろ・イボ・黒シミでお悩みの方へ

炭酸ガスレーザー

CO2Esprit (CO2エスプリ)

用途が広く、実績と信頼を誇る国産レーザー


ほくろやイボは、お化粧品ではなかなか隠し切れず
年齢より老けて見られたり位置によっては、
コンプレックスの原因ともなることがあります。
メスを使わずにレーザーによって、
安全に取り除くことができます。



【形成外科診療体制】

8:30~17:30 (午前受付12時)
水曜・祝祭日 休診

	日	月	火	水	木	金	土
午前				定休日			
午後		○					



〒901-2133 沖縄県浦添市城間1-37-12

TEL 098-876-2212

お気軽に

医療法人八重瀬会 同仁病院

FAX 098-876-4209

お電話下さい！

CO2レーザー治療について

- (1) この治療は、炭酸ガスレーザー照射により瞬間的に皮膚表面を蒸散させ、いぼ・ほくろ等の隆起性病変を除去することを目的とした治療です。
- (2) 症状によっては2回以上の治療が必要な場合もあります。
- (3) 術後多少赤みが残りますが、1～2週間後に皮膚ができます。
症例によっては、治癒してから約3ヶ月は傷の凹みが残る場合があります。
- (4) 治療後傷の凹みがなくなり、治療部位が目立たないようになるには約1年程度かかります。
- (5) 原則として治療部位の発赤が取れるまでの期間はその部位の再照射ができません。
- (6) 当日から洗顔やシャワー浴は可能です。テープが剥がれたら、その都度処置をして下さい。
- (7) 個人差によりレーザー治療後の炎症性色素沈着が3～6ヶ月続きます。その間は、日焼けをしないよう、日焼け止めクリームを塗るようにして下さい。
- (8) いぼ・ほくろは再発することがあります。これは、目に見えない細胞が1回の治療で取りきれなかった場合に起こります。
再発を繰り返す場合、レーザー以外の方法（切除）が良い場合もあります。

※ご不明な点があれば、形成外科までお気軽にご相談ください。

炭酸ガスレーザー料金表

	初診 (5か所まで)	再診 (5か所まで)
1 cm 未満	1か所 1000円	1か所 3000円
1 cm 以上	1か所 2000円	1か所 4000円

